

## **STANOVISKO K INHALAČNÍMU ÚVODU DO ANESTEZIE U DĚTÍ**

1. Inhalační úvod do celkové anestézie před zajištěním vstupu do krevního řečiště je u dětí postup možný a všeobecně používaný, obvykle u plánovaných výkonů.
  2. Zajištění vstupu do krevního řečiště v co nejkratší možné době po úvodu do anestézie je doporučeno.
  3. Provádění inhalačního úvodu do celkové anestézie bez současně zajištěného vstupu do krevního řečiště u dítěte s rizikem aspirace, s existující poruchou průchodnosti dýchacích cest nebo s předpokladem jejího zhoršení (např. edém, deformita, krvácení v oblasti související anatomicky nebo funkčně s dýchacími cestami) není doporučeno.
  4. Zavádění tracheální rourky nebo alternativní pomůcky zajištění dýchacích cest (např. laryngeální maska) v inhalační anestézii bez zajištění vstupu do krevního řečiště s výjimkou situací tzv. krajní nouze (resuscitace) není doporučeno.
- 

Pracovní skupina:

Vladimír Mixa, Ivan Herold, Jan Šturma, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Michal Klimovič  
Schváleno výborem ČSARIM dne 30.11.2008